

**PLANTES NOUVELLES, RARES OU CRITIQUES
DES SERRES DU MUSÉUM**

(NOTULES SUR QUELQUES ORCHIDÉES D'INDOCHINE. XXXIV)

Par A. GUILLAUMIN

492. — **Taeniophyllum Daroussinii** Tixier et Guillaum. sp. nov.

Acaulis, radicibus usque ad 5 cm longis, complanatis, usque ad 0,3 cm latis, atro viridibus. Inflorescentia 0,5 cm longa, floribus 2-3, 4 mm longis, pallide luteis, bracteis triangularibus, scariosis, pedicello cum ovario 2 mm longo, sepalis petalisque liberis, sepalis superiore elliptico, 3 mm longo, apice apiculato, lateralibus leviter latoribus et falciformibus, apice apiculatis, petalis sepalo superiore similibus sed haud apiculatis, labello calceolari, lobis lateralibus fere indistinctis, medio triangulari, apice incurvo, calcare pendulo, cylindrico, 2 mm longo, columna alba, globosa, polliniis 4, globosis, caudiculo filiformi, retinaculo minimo.

Annam : sur les Hévées des plantations de Xuân Lo, à 2-2,50 m de hauteur (TIXIER f. 300, 1963).

Se rapproche de *T. Exuperei* Guillaum. par ses pièces florales libres et ses racines aplaties mais l'inflorescence est très courte, glabre et il n'y a pas de callus à l'entrée de l'éperon.

Dédié à M. DAROUSSIN, président-directeur des plantations d'Hévées de Xuân Lo.

493. — **Malleola vietnamensis** Guillaum. sp. nov.

Caudex 4 cm altus, atro rubro viridis, foliis 4, lanceolatis, (usque ad 4 cm × 1 cm), apice levissime inaequaliter acutis, supra canaliculatis atro rubro viridibus, subtus levissime carinatis atro viridibus. Inflorescentia pendula, racemosa, vaginas terebrans, 3 cm longo, fere usque ad basin florifera, vagina 1, triangulari, bracteis lanceolatis, brevibus, pedicello 4 mm longo, sepalis petalisque luteis, longitudinaliter rubro 2-lineatis, sepalis superiore ovato, 2 mm longo, lateralibus falcatis, ovato spathulatis, aequilongis, petalis ellipticis aequilongis, labello lobis lateralibus erectis, 1 mm altis, quadratis, luteis rubro marmoratis, terminali albo, anguste lanceolato, recurvo, 2 mm longo, calcare luteo viridi, pendulo, cylindrico, apice truncato et levissime dilatato, 5 mm longo, columna brevi, ad margines roseo tincta, antherae operculo discoideo, polliniis 2, caudiculo longo, incurvo, dimidio superiore late dilatato, inferiore filiformi, retinaculo minimo.

Annam : Nha trang (TIXIER f. 7, 1963).

La présence du genre *Malleola*, créé par J. J. SMITH et SCHLECHTER (FEDDE, *Repert.*, Beih. I, p. 979, 1913) au dépend de *Saccolabium* pour des espèces à pollinies à bandclette légèrement genouillée élargie au sommet et filiforme à la base, n'avait pas encore été signalée en Indochine bien que HOLTUM (*Fl. Malaya*, I, *Orchids*) en mentionne 7 espèces dans la Péninsule malaise.